

Tab. 1. Zwalczanie chwastów uciążliwych jesienią w zbożach i rzepaku

Substancja czynna	Roślina uprawna*	Wrażliwe chwasty uciążliwe, głównie zimujące	Możliwość łącznych zabiegów z:
2,4-D	j, p	rzepak, tasznik, tobołki	dikamba, florasulam
2,4-D + dikamba	j, p, (j, p, pż, ż wiosna)	chaber, maruna, przytulia, tasznik, tobołki	-
aminopyralid + chlopyralid + pikloram	rz	chaber, fiołek, mak, maruna, ostrożeń, przytulia, rumiany, rumianki	-
aminopyralid + metazachlor + pikloram	rz	chaber, mak, maruna, rumianki	-
beflubutamid + izoproturon	p	fiołek, mak, rumian, tobołki	-
bifenoks	rz (j, p, pż, ż wiosna)	fiołek, mak, maruna, przytulia, tasznik, tobołki	-
chinomerak + metazachlor	rz	blekot, maki, przytulia, rumiany, rumianki, tasznik	dimetenamid-P
chlopyralid	rz (p wiosna)	chaber, maruna, ostrożeń, rumiany, rumianki	propyzamid
chlorosulfuron	j, p, pż, ż	maruna, przytulia, rzepak	diflufenikan, izoproturon
chlorotoluron	j, p, ż	chaber, rumian, tasznik, tobołki	chlorosulfuron, diflufenikan, pendimetalina
diflufenikan + flufenacet	j, p, pż, ż	fiołki, maruna, przytulia, rzepak, tasznik, tobołki	-
diflufenikan + jodosulfuron + mezosulfuron	p, pż, ż	chaber, fiołek, maruna, przytulia, rzepak, tasznik, tobołki	-
diflufenikan + florasulam + penoksulam	j, p, pż, ż	chaber, fiołek, maruna, przytulia, rzepak, tasznik, tobołki	-
dimetenamid-P + metazachlor	rz	bodziszek, maruna, przytulia, rumian, rumianek, tasznik, tobołki	chinomerak
etamsulfuron metylu	rz	bodziszki, stulicha, tasznik, tobołki	-
flufenacet + metrybuzyna	j, p, pż, ż	bodziszek, mak, maruna, rzepak, rumian polny, tasznik pospolity.	-
flupyrsulfuron metylowy	p, pż, ż	chaber, mak, maruna, rumiany i rumianki rzepak, tasznik, tobołki	-
imazamoks + chinomerak + metazachlor	rz	maruna, przytulia, rzepak (odmiany wrażliwe), tasznik, tobołki polne.	-
izoproturon	j, p, pż, ż	mak, maruna, rzepak, tasznik, tobołki	chlorosulfuron, diflufenikan, flufenacet, pendimetalina
jodosulfuron	p, pż, ż	mak, maruna, przytulia, rumian, rzepak, stulicha, tasznik, tobołki	diflufenikan, mezosulfuron
MCPA + dikamba	p (pż, ż wiosna)	mak, przytulia, rzepak, tasznik, tobołki	amidosulfuron i mekoprop-P (wiosna)
metazachlor	rz	mak, maruna, przytulia, rumiany, rumianki, stulicha, tasznik, tobołki	aminopyralid, chlopyralid, chinomerak, dimetenamid-P, imazamoks, pikloram
pendimetalina	j, p, pż, ż	chaber, fiołki, maruna, przytulia, rzepak	diflufenikan, izoproturon
pendimetalina + pikolinafen	p, pż, ż	bodziszek, fiołek, mak, przytulia, rumianek, rzepak, tasznik, tobołki	-
propyzamid	rz	bodziszki, szczawie	chlopyralid
prosulfokarb	j, p, pż, ż	przytulia	-
tribenuron metylu	p, pż (j, ż wiosna)	chaber, fiołki, maruna, ostrożeń, tasznik, tobołki	fenaksaprop-P-etylu, fluoksypyr, mekoprop-P, sulfosulfuron, tifensulfuron (wszystkie wiosną)

* rz–rzepak, p–pszenica, psz–pszenżyto, ż–żyto, j–jęczmien